


Jext® Check list per il Medico Prescrittore

- » Jext® è una penna pre-riempita (auto-iniettore) che rilascia una dose di adrenalina (come tartrato)
- » Jext® è indicato nel trattamento di emergenza delle reazioni allergiche gravi e acute (anafilassi) dovute a punture o morsi di insetti, alimenti, farmaci, o altri allergeni così come nelle anafilassi idiopatiche o indotte da esercizio fisico¹.
- » La formazione dei pazienti e di coloro che se ne prendono cura è cruciale per assicurare il tempestivo e corretto utilizzo e somministrazione di adrenalina in situazioni di emergenza, e di conseguenza è una parte importante della gestione del rischio per il paziente. Inoltre la conoscenza di una tecnica adeguata di somministrazione e dell'utilizzo del dispositivo diminuiscono il rischio di una somministrazione accidentale o non necessaria del farmaco, minimizzando il rischio di reazioni avverse.
- » Lo scopo di questa check-list è di aiutarla in qualità di Medico Prescrittore nell'istruire il paziente, o chi se ne prende cura, al corretto utilizzo, alla conservazione ed alla cura di Jext®. La check list può essere utilizzata come uno strumento di formazione generale o per documentare le visite dei singoli pazienti.

I materiali educazionali per il corretto utilizzo, conservazione e cura di Jext® sono disponibili per i pazienti e per coloro che se ne prendono cura:

- » Jext® Trainer
- » Video informativo
- » Carta di informazione per il paziente



1. Jext® Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Jext® Check list per il Medico Prescrittore

- » Si assicuri che Lei, in qualità di Medico Prescrittore, sia in grado di rispondere “sì” alle domande riportate di seguito relative alla prescrizione, utilizzo, conservazione e cura di Jext®.

Nome del Paziente: _____

» Prescrizione

Il paziente pesa tra 15kg e 30kg?	<i>Prescrivere Jext® 150 microgrammi</i>
Il paziente pesa più di 30kg?	<i>Prescrivere Jext® 300 microgrammi</i>
Sono stati prescritti al paziente due auto-iniettori Jext®?	
E' stato raccomandato al paziente di portare sempre con sé i due auto-iniettori Jext®?	

» Istruzioni d'uso

Il paziente è stato istruito su quali siano le circostanze in cui utilizzare Jext®?	
Al paziente è stata mostrata la tecnica corretta di utilizzo e somministrazione?	
Il paziente è stato istruito sulla necessità di chiamare il 112, richiedere un'ambulanza e dichiarare uno stato di anafilassi subito dopo la somministrazione di Jext®	
Il paziente è a conoscenza del fatto che deve somministrarsi una seconda dose dell'auto-iniettore Jext® dopo 5-15 minuti in assenza di miglioramento dal punto di vista clinico?	
E' stato fornito al paziente un Jext® Trainer per migliorare la tecnica di utilizzo in previsione di possibili future somministrazioni?	
Il paziente è stato istruito di non portare o conservare il suo Jext® Trainer assieme all'auto-iniettore Jext®?	
E' stata consegnata al paziente la Carta di informazione per il paziente quale strumento aggiuntivo da sfruttare come guida e per esercitarsi nella tecnica di utilizzo?	
E' stato raccomandato al paziente di vedere il video dimostrativo su come utilizzare Jext®? Il video è disponibile in una penna USB fornita al medico o scaricabile dal link del QR code presente nel Foglio Illustrativo	

» Conservazione e cura

Il paziente è stato informato di conservare il suo Jext® al di sotto dei 25°C e di evitare di congelare il prodotto?	
Il paziente è stato informato di controllare periodicamente la soluzione di adrenalina attraverso la finestra di ispezione del dispositivo per essere sicuro che la soluzione sia limpida e incolore e di sostituire l'auto-iniettore se la soluzione ingiallisce o presenta un precipitato?	
Il paziente è stato avvisato di controllare periodicamente il proprio Jext® e assicurarsi di sostituirlo entro la data di scadenza?	

Firma del Medico Prescrittore: _____ Data: _____

Jext®: istruzioni per l'uso²

1»



Afferrare l'iniettore Jext® con la mano dominante (quella usata per scrivere) e con il pollice vicino al tappo giallo.

2»



Togliere il tappo giallo con l'altra mano.

3»



Posizionare la punta nera dell'iniettore contro la parte esterna della coscia, mantenendo l'iniettore ad angolo retto (circa 90°) rispetto alla coscia.

4»



Premere energicamente la punta nera sulla parte esterna della coscia fino a sentire 'click' a conferma che l'iniezione è iniziata, poi tenerla premuta. Mantenere saldamente l'iniettore in sede contro la coscia per 10 secondi (contare piano fino a 10) quindi rimuoverlo. La punta nera si estenderà automaticamente nascondendo l'ago.

5»



Massaggiare la zona dell'iniezione per 10 secondi. Cercare immediatamente assistenza medica. Chiamare il 112, richiedere un'ambulanza, dichiarare uno stato di anafilassi. Se non si riesce ad effettuare la chiamata, qualcun altro deve chiamare al vostro posto.